



Guide d'Évaluation Rapide MAMI

Prise en charge des nourrissons de moins de 6 mois petits et à risque nutritionnel et de leurs mères

NOTES:

1. Se référer aux Fiches de Conseil et au Livret d'Actions de Soutien MAMI.
2. En cas de perte de poids documentée ou de défaut de prise de poids adéquat (moins de 5g/kg/jour) ou si la mère signale que le nourrisson a perdu du poids ou n'a pas pris de poids, il faut procéder à une évaluation MAMI.
3. Cela concerne tout mode d'alimentation : allaitement maternel, allaitement non maternel ou alimentation mixte.
4. Signes de danger de la PCIME + étape 2 : anthropométrie du nourrisson). Cela limitera la prise en charge MAMI aux nourrissons présentant un déficit anthropométrique existant et nécessitant une prise en charge immédiate. Si les capacités le permettent, le dépistage des critères élargis (étape 3 : problèmes d'alimentation du nourrisson + étape 4 : santé et bien-être de la mère) en plus des critères de base. Les critères de dépistage élargis visent à identifier les nourrissons et les mères à risque mais sans déficit anthropométrique en cours et à les empêcher de développer des retards de croissance.

ÉVALUATION

PRINCIPAUX CRITÈRES D'ÉVALUATION 4

1. SIGNES DE DANGER PCIME

VÉRIFIER :

SIGNES GÉNÉRAUX DE DANGER

- Incapable de boire ou d'allaiter ou vomit tout
- Convulsions
- Difficulté à respirer
- Température élevée ou basse
- Léthargique ou inconscient
- Se référer à la PCIME pour les détails sur les signes de danger

SIGNES DE DANGER SPÉCIFIQUES À MAMI

Œdème bilatéral (+, ++ ou +++)

2. CROISSANCE DU NOURRISSON

DEMANDER :

- Le nourrisson est-il né avant terme (prématuré) ou trop petit (faible poids de naissance) ? (signalé ou documenté)
- Le nourrisson a-t-il récemment perdu du poids ou n'a-t-il pas pris de poids, y compris les nouveau-nés qui n'ont pas repris leur poids de naissance ? (signalé ou documenté)²

MESURE :

PAZ et/ou PB

3. ALIMENTATION DU NOURRISSON

DEMANDER :

- Le nourrisson a-t-il des difficultés à s'alimenter ?³
- Le nourrisson reçoit-il habituellement des aliments ou des boissons autres que le lait maternel ?
- La mère a-t-elle un ou plusieurs problèmes mammaires ou d'alimentation ? (déclaré ou observé)

DEMANDER ET REGARDER :

- La mère souffre-t-elle d'une maladie qui nécessite une évaluation plus approfondie ? (rapportée ou observée)
- La mère a-t-elle eu récemment des difficultés à s'occuper de son enfant ou d'elle-même ?

MESURE:

PB

CLASSIFIER
TOUTES LES MÈRES ET
TOUS LES NOURRISSONS

SIGNES

CLASSIFICATION

ACTION

UN OU PLUSIEURS SIGNES SUIVANTS :

- Incapacité à se nourrir
- Convulsions
- Tirage sous-costal sévère
- Respiration rapide
- Température corporelle élevée ou basse
- Mouvement qu'en cas de stimulation ou pas de mouvement du tout
- - Œdème bilatéral (+, ++ ou +++)

PATHOLOGIE SEVERE

Fournir un traitement pré-référentiel conformément à la PCIME

Référer d'URGENCE à l'hôpital (traitement des problèmes graves et soutien adapté à MAMI), ou

Si la prise en charge est REFUSÉE ou PAS FAISABLE : traiter dans l'établissement de santé le plus proche jusqu'à ce que la prise en charge soit possible.

UN OU PLUSIEURS SIGNES SUIVANTS :

- Nourrisson né prématurément
- Faible poids de naissance
- Perte de poids récente ou défaut de prise de poids
- Nourrisson n'ayant pas repris son poids de naissance à l'âge de deux semaines.
- PB inférieure à 115 mm
- PAZ inférieure à -2

UN OU PLUSIEURS SIGNES SUIVANTS :

- Nourrisson ayant des difficultés à s'alimenter
- Nourrisson qui reçoit souvent des aliments ou des boissons autres que le lait maternel.
- Mère ayant des problèmes d'alimentation ou de d'allaitement

RISQUE POTENTIEL

Orientez la mère et le nourrisson vers le point de service MAMI le plus proche pour une évaluation plus approfondie.

UN OU PLUSIEURS SIGNES SUIVANTS :

- La mère souffre d'une maladie nécessitant une évaluation plus approfondie
- La mère dit avoir eu des difficultés à s'occuper de son bébé ou d'elle-même récemment.
- La mère a un PB inférieur à 230 mm

RISQUE FAIBLE

- Aucun signe de maladie grave ou de risque potentiel lié à MAMI

Féliciter et rassurer
Orienter vers les soins de santé de routine & conseils ANJE